

Badania na obecność wirusa papilloma HPV u kobiet, które otrzymały odbiegający od normy wynik badania przesiewowego na raka szyjki macicy

Informacje dla kobiet

Co to jest wirus papilloma (HPV)?

HPV jest skrótem od Human Papilloma Virus (wirus papilloma, czyli brodawczak ludzki).

HPV to bardzo rozpowszechniona infekcja szyjki macicy.

Większość kobiet, w pewnych okresach swojego życia, jest zarażonych tym wirusem. W większości przypadków nie wymaga on leczenia, a organizm sam się go pozbywa.

Istnieje wiele rodzajów wirusa HPV, a większość z nich jest nieszkodliwa. Niektóre z nich powodują powstanie nieprawidłowości w obrębie szyjki macicy. Takie rodzaje wirusa określane są jako odmiany wirusa HPV 'wysokiego ryzyka'. Często zmiany w szyjce macicy ustępują, gdy wirus znika. U niektórych kobiet obecność wirusa utrzymuje się, co powoduje, że takie kobiety są bardziej narażone na rozwinięcie się – mogących wymagać leczenia - nieprawidłowości (CIN) w obrębie szyjki macicy.

Jak można się zarazić wirusem HPV?

Wirus HPV to bardzo rozpowszechniona infekcja wśród osób, które kiedykolwiek były seksualnie aktywne. Ponieważ wirus nie wywołuje żadnych objawów, to możliwe jest że:

- Można być, nic o tym nie wiedząc, wieloletnim nosicielem wirusa
- Partner może być od wielu lat zakażony i także nic o tym nie wiedzieć.

Dlaczego powinnam poddać się badaniom?

Badaniom na obecność wirusa HPV poddane zostaną próbki kobiet, których wyniki wykazują - po raz pierwszy - zmiany na granicy normy, lub łagodne zmiany w dojrzewaniu komórek złuszczaających się (dyskaryosis). Kobiety poddające się, z powodu poprzednio wykrytych nieprawidłowości, powtórny badaniom przesiewowym nie będą badane na obecność wirusa HPV.

U kobiet ze zmianami na granicy normy lub łagodnymi zmianami dyskaryosis, istnieje jedynie 15 do 20% prawdopodobieństwa wystąpienia znacznych zmian, czyli wymagających leczenia. Badanie na obecność wirusa HPV jest istotne, ponieważ skutecznie identyfikuje kobiety, które mogą wymagać leczenia.

Uprzednie studium pilotażowe, przeprowadzone przez NHS, wykazało, że badania na obecność wirusa HPV mogą zapobiec niepotrzebnie powtarzanym badaniom przesiewowym, a - jeśli istnieją wymagające leczenia zmiany - są one szybko wykrywane.

Na czym polega to badanie?

Badania dokonuje się na próbce komórek pobranych w trakcie badania przesiewowego, a więc nie ma potrzeby przychodzenia na ponowne badanie. Probki badane są w laboratorium, a wynik otrzymasz pocztą.

Co się stanie jeśli mam wirusa HPV?

W przypadku stwierdzenia obecności wirusa HPV w twojej próbce, zostaniesz zaproszona na badanie wzniernikowania pochwy (colposkopy). Wziernikowanie pochwy umożliwia dokładne obejrzenie szyjki macicy w celu stwierdzenia, czy potrzebne jest dalsze leczenie. Jeśli zostaniesz skierowana na leczenie, jest ono z reguły prowadzone ambulatoryjnie, bez potrzeby pobytu w szpitalu. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat wzniernikowania pochwy, możesz porozmawiać ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu (GP), osobą pobierającą próbkę, lub w lokalnej przychodni. Możesz także przeczytać ulotkę 'Cervical Screening –

The Colposcopy Examination' ('Badania przesiewowe na raka szyjki macicy – wzniernikowanie'.)

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o wirusach HPV?

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o badaniach na obecność wirusa HPV, lub na temach innych, poruszonych w niniejszej ulotce, spraw - możesz porozmawiać z pielęgniarką w swojej przychodni lekarskiej, lub odwiedzić witrynę NHS Cancer Screening Programmes:
www.cancerscreening.nhs.uk